



CONCIME ORGANO MINERALE NP IN SOSPENSIONE CON MICROELEMENTI CHELATI E AMINOACIDI
PER LA STIMOLAZIONE DEL SISTEMA RADICALE

Presentazione: Soluzione Liquida (SL)


Densità: 1,2

Intervallo di stabilità pH: 4-9

pH: 5,9 (soluzione 1%)

PACKAGING DISPONIBILE

TANICHE



SPECIFICHE TECNICHE

Aminoacidi liberi: 7% p/p (84 g/l)

Azoto (N) totale: 5,5% p/p (66 g/l)

Azoto (N) organico: 1,5% p/p (18 g/l)

Carbonio (C) organico di origine biologica: 6%

Anidride Fosforica (P_2O_5): 5% p/p (60 g/l)

Ferro (Fe) solubile in acqua chelato EDDHA: 0,036% p/p (0,4 g/l)

Manganese (Mn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,05% p/p (0,6 g/l)

Zinco (Zn) solubile in acqua chelato EDTA: 0,07% p/p (0,8 g/l)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,1% p/p (1,2 g/l)

PRINCIPALI BENEFICI

- Promuove la formazione delle radici, attivando il sistema radicale e stimolando la crescita
- Aumenta lo sviluppo vegetativo e l'ingrossamento dei frutti durante le fasi iniziali del ciclo vegetativo della pianta e la maturazione dei frutti
- Efficiente effetto antistress in avverse situazioni climatiche (stress idrico o termico, periodi di trapianto, stress fitotecnici da diserbo, ecc.) grazie al contenuto di aminoacidi L-a liberi
- Effetto stimolante e tonificante per la crescita, particolarmente durante i periodi critici della coltura (trapianto, giovani piante in una fase di crescita attiva, maturazione, ecc.)
- Predominanza di specifici aminoacidi che attivano lo sviluppo delle radici, come arginina, acido aspartico e metionina

DOSI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

FERTIRRIGAZIONE		
Colture orticole	5-10 L/ha	3-5 applicazioni dopo la semina o trapianto, durante le prime fasi del raccolto e in tutto il ciclo colturale
Frutticole: melo, pero, kiwi, agrumi, olivo, nocciolo, drupacee	6-10 L/ha	Applicazioni alla ripresa vegetativa, durante le prime fasi e per tutto il ciclo colturale
Vivaio	5-8 L/ha	Alla messa a dimora delle piantine per stimolare la radicazione e durante lo sviluppo vegetativo
Fragole	6-8 L/ha	4-6 applicazioni dopo il trapianto, durante le prime fasi del raccolto e in tutto il ciclo colturale

APPLICAZIONE FOGLIARE

- Nel caso di miscele complesse e applicazioni a bassi volumi, effettuare saggi preliminari
- Per il corretto posizionamento, dosaggio e miscelazione del prodotto, rivolgersi a personale tecnico specializzato

Frutticole: melo, pero, kiwi, agrumi, olivo, nocciolo, drupacee	2-2,5 L/ha	Applicazioni alla dose di 200-250 ml/hl d'acqua, ideale alla ripresa vegetativa o in fase di ingrossamento dei frutti
Colture orticole	2-3 L/ha	Alla messa a dimora delle piantine per stimolare la radicazione e durante lo sviluppo vegetativo con effetto biostimolante e antistress
Vite	2-3 L/ha	Applicare dalle prime fasi vegetative della coltura e dopo l'allegagione per favorire lo sviluppo del grappolo e la maturazione.
Vite in vivaio	2-2,5 L/ha	Alla messa a dimora delle piantine per stimolare la radicazione e durante lo sviluppo vegetativo con effetto biostimolante e antistress
Colture estensive	1,5-2 L/ha	Particolarmente indicato in abbinamento ai diserbi delle colture, esplica un efficace effetto biostimolante e detossificante
Diserbi in microdosi	0,5-1 L/ha	Indicato a dose più bassa con applicazioni ravvicinate